

# LA GALE BOVINE



## La gale en élevage bovin

- ★ Plusieurs types de gale
- ★ La plus répandue: gale psoroptique (psoroptes ovis)

## Agent infectieux : psoroptes ovis

- ★ Acarien
- ★ Vit sur la peau de l'animal
- ★ Se nourrit de lymphe et de sang
- ★ Cycle de vie de 12 jours
- ★ Durée de vie de 48 jours sur l'hôte
- ★ Durée de vie de 16 jours dans le milieu
- ★ Non transmissible à l'homme

## Symptômes

- ★ Hypersensibilité
- ★ Démarre du garrot et de la base de la queue
- ★ Généralisation rapide et fréquente
- ★ Hyperkératose
- ★ Fréquentes complications bactériennes
- ★ 1% de surface corporelle atteinte = - 30 g de GQM

## Facteurs favorisant l'infection

- ★ Humidité relative élevée (70 à 100 %)
- ★ Température de 5 à 10 c°
- ★ Forte prédisposition des BBB
- ★ Contact entre les animaux

## Traitement

- ★ 1° TONDRE
  - ★ 2° APPLIQUER LE TRAITEMENT
  - ★ 3° TRAITER LE MILIEU + VIDE SANITAIRE (16 J)
  - ★ 4° REPETER LE TRAITEMENT (12 J)
- (aucun produit ovicide)

## A EVITER

- ★ Sous dosage des produits
- ★ Contact entre traités et infectés

