

STRATEGIE DU RATIONNEMENT DE LA VACHE LAITIERE EN PERIODE DE TARISSEMENT



La période du tarissement est cruciale sur le plan alimentaire pour le bon démarrage de la lactation et pour la prévention des troubles qui entourent le vêlage : difficultés de parturition, rétention placentaire, fièvre vitulaire, "syndrome de la vache grasse", cétose, infertilité, mortalité néonatale,...

Importance du tarissement

Le tarissement est obligatoire pour une bonne relance hormonale qui est indispensable au maintien de la productivité de la vache au cours des lactations successives. Il n'a pas pour objet principal la reconstitution des réserves corporelles qui doit intervenir autant que possible pendant la seconde partie de la lactation précédente.

Niveau alimentaire :

- ★ ajusté : selon l'état d'entretien (pour une note d'état corporel de 3.5)
- ★ restrictif : séparation des vaches tarées
- ★ progressif : au début, donner un régime minimum à base de fourrages, et par la suite, introduction graduelle de concentrés suivant l'état corporel individuel

Nature de la ration :

- ★ même "**fond de cuve**" pour la microflore ruminale,
- ★ ½ d'ensilages (herbe, maïs) maximum : ~ 6 kg M.S. + foin et/ou paille,
- ★ concentrés : 1 à 2 et parfois 3 kg/vache/jour 3 sem. avant vêlage.

Equilibre du régime :



en prévention de ...

- ★ 7.000 à 8.000 VEM syndrome de la "vache grasse"
- ★ 400 à 600 g DVE développement du foetus-immunité
- ★ 36 - 61 g Ca hypocalcémie puerpérale
- ★ 27 - 35 g P
- **ration acidogène 3 semaines avant le vêlage**
- ★ ~ 20 g Mg "vache couchée"
- ★ 14-16 g Na oedème
- ★ oligo : Zn, Cu, I, Se-Vit E infertilité - immunité
- ★ vitamines A = 60.000 UI